

الكزاز "التيتانوس"

2021-06-07

=src

أ.د. عبد الرؤوف علي المناعمة :src

الجامعة

الإسلامية - غزة/دولة فلسطين

البريد الإلكتروني: elmanama_144@yahoo.com

إسلام المناعمة :src

الجامعة الإسلامية - غزة/دولة فلسطين

البريد الإلكتروني: elmanama1996@gmail.com

مقدمة

مرض حاد وغالباً مميت، ناتج عن سموم بكتيريا المطثية الكزازية Clostridium tetani. يتميز هذا المرض بنوع من الصلابة التي تصيب المصاب وتشنح في العضلات الهيكلية مع حدوث نوبات صرعية. عادةً ما يتضمن تشنح مفصل الفك والرقبة. تم التعرف على الكزاز لأول مرة بواسطة أبقراط. وبدأت الدراسات فعلياً وفهم الآلية عام 1884. وفي 1889، تم عزل البكتيريا من شخص بعدها تم حقنه في حيوان فأصيب بالمرض، ولوحظ أنه من الممكن معادلة السم بواسطة أجسام مضادة خاصة. تم استعمال توكسيد الكزاز بشكل واسع لأول مرة في الحرب العالمية الثانية.

الكائن المسبب

المطثية الكزازية C. tetani، بكتيريا عصوية موجبة غرام، لاهوائية قد تكون أبواغ طرفية ما يعطيها شكل عصا الطبل. هذا الميكروب حساس للحرارة. بينما الأبواغ مقاومة للحرارة والمطهرات المستخدمة بالعادة والفينول. أيضاً قد تتحمل جهاز التعقيم-الأوتوكلاف- عند درجة حرارة 121 سليزيوس لمدة 10 - 15

دقيقة. تتواجد الأبواغ في التربة، في أمعاء وبراز بعض الحيوانات وعلى الأسطح الملوثة. قد تبقى كامنة من أشهر لسنوات.

تنتج المطثية الكزازية C. tetani عدة سموم منه: تيتانوسبامين. وهو سام للأعصاب والمسؤول عن أعراض الكزاز. تقدر الجرعة القاتلة من التيتانوسبامين 2.5 نانوجرام/كجم من وزن الشخص. يمكن تدمير السم بتعريضه لدرجة حرارة 65 س لمدة 5 دقائق.

الإمراضية

عادة تدخل أبواغ المطثية الكزازية C. tetani الجسم عبر الجروح. وفي ظروف لاهوائية، تنبت الأبواغ. يتم إنتاج السموم وتنتقل عبر الدم والعقد الليمفاوية. ويصل للجهاز العصبي المركزي ويؤثر على عدة مواقع مثل الدماغ والحبل الشوكي، وتبدأ أعراض الكزاز كنتيجة لمنع السم إطلاق النواقل العصبية acetylcholine. وهذا يفسر تقلص العضلات والتشنجات. من الممكن أن تحصل نوبات تشنج شديدة للغاية، وقد يتأثر الجهاز العصبي اللاإرادي.

يمكن أن يتعرض الأشخاص من جميع الأعمار للإصابة بمرض الكزاز ولكن يعتبر هذا المرض بشكل خاص شائع وخطير في الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، يُسمى الكزاز الذي يحدث أثناء فترة الحمل أو في خلال الأسابيع الستة من نهاية الحمل "بالكزاز الأمومي"، في حين يُسمى الكزاز الذي يحدث خلال 28 يوم الأولى من العمر باسم "الكزاز الوليدي".

كزاز الأطفال(الوليدي) يصيب الطفل حديث الولادة الذي لم يكن لدى أمه مناعة ضد المرض. ويُعد كزاز الوليد أكثر شيوعاً في المناطق الريفية حيث تحدث الولادة في غياب أدوات التعقيم الكافية. ومن الأسباب الشائعة للإصابة بكزاز المواليد، عدم استخدام أدوات نظيفة في قص الحبل السري بعد الولادة. عادة يحصل من خلال التهاب في منطقة ما بعد قطع الحبل السري خاصة إذا تم قطعه بأداة غير معقمة. كزاز الرضع منتشر في بعض الدول النامية، يقدر عدد الوفيات بأكثر من 257000 شخص سنوياً خلال الفترة 2000-2003 حول العالم. وطبقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، توفي 49 ألف رضيع نتيجة للإصابة بكزاز المواليد في عام 2013.

الأعراض

فترة حضانة المرض تمتد من 3-21 يوم، وأحياناً 8 أيام. كلما بُعد موقع الإصابة عن الجهاز العصبي المركزي فإن فترة الحضانة تتطول. **كلما كانت فترة الحضانة أقصر، كلما زاد خطر الوفاة.**

هناك أعراض مبكرة للكلز وهي تصلب الفك (الأكثر شيوعاً)، والتصلب العام، وحوادث مشاكل في البلع. أما الأعراض اللاحقة فتشمل حدوث تشنج شديد في العضلات وأعراض شبيهة بالنوبة، واضطرابات شديدة في الجهاز العصبي. وبشكل عام، تحدث الوفاة بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% من حالات الإصابة بالكلز، إلا أن احتمال خطر الوفاة يزيد على بعض الفئات الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق والتي تشكل (18%) والأشخاص غير الملقحين (22%). في حوالي 20% من وفيات الكلز، لم يتم تحديد آلية واضحة ويعزى الموت إلى الآثار المباشرة لسم بكتيريا الكلز. في أكثر الأنواع شيوعاً من حالات الكلز المسجلة المعروف ب (الكلز المعقم)، يستمر التشنج لمدة 3-4 أسابيع، وقد يستغرق الشفاء أشهر.

مضاعفات محتملة

من المضاعفات التي قد تحصل لمريض الكلز: تشنج الأجيال الصوتية، يمكن للتقلصات العضلية الناجمة عن الكلز الشديد أن تؤثر على التنفس أو توقفه. ويُعد فشل الجهاز التنفسي السبب الأكثر شيوعاً للوفاة. قد ينجم أيضاً عن نقص الأكسجين توقف القلب والوفاة. يُعد الالتهاب الرئوي سبباً آخر من أسباب الوفاة. قد تتسبب شدة الانقباضات والتشنجات في كسر أحد العظام والعمود الفقري. فرط نشاط الجهاز العصبي اللاإرادي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

التشخيص

لا يعتمد التشخيص على تأكيد وجود البكتيريا إنما على الأعراض السريرية، تم عزل C. tetani من الجروح في 30% فقط من الحالات. الفحص المخبري للبكتيريا يعتمد على ما إذا كانت السلالة مُنتجة للسموم من خلال استخدام فُئران التجارب وفحوصات مصلية.

الانتشار وطرق الانتقال

يحدث الكلز في جميع أنحاء العالم، لكن بشكل أكبر في المناطق المكتظة ذات المناخ الحار الرطب وتربة غنية بالمواد العضوية. لا ينتقل الكلز من شخص إلى شخص؛ وهو أمر غير معتاد في الأمراض التي يمكن منعها باللقاح. بدلاً من ذلك، ينتقل الكلز عن طريق دخول بكتيريا المطثية الكلزية إلى الجلد المصاب والأنسجة الداخلية من البيئة الملوثة بأبواغ هذه البكتيريا. حيث توجد الأبواغ في كل مكان في البيئة، ولاسيما في التربة والرماد وأمعاء الحيوان والإنسان وبرازهما، وعلى سطح الجلد والأدوات التي يعلوها الصدا مثل المسامير والإبر والأسلاك الشائكة، وما إلى ذلك. ونظراً إلى أن الأبواغ لديها قدرة كبيرة على تحمل الحرارة ومعظم المطهرات، فإنها قد تبقى على قيد الحياة لسنوات. المفاجئ هو أن حدوث الإصابة بالكلز من جرح صغير أكثر احتمالاً من

حدوثها من جرح كبير، والسبب في هذا هو أن الجروح العميقة تُعالج وتنظف بشكلٍ لائق بينما يتم إهمال الجروح السطحية.

في عام 2015، توفي نحو 34000 طفل حديث الولادة نتيجة للكلز الوليدي، ما يعني انخفاضاً بنسبة 96% عن عام 1988 الذي توفي فيه ما يقدر بنحو 787000 رضيع حديث الولادة نتيجة لإصابتهم بالتيتانوس خلال الشهر الأول من العمر، ويعود ذلك في المقام الأول إلى التوسع في التمنيع. في عام 2016، تم تطعيم 86% من الرضع في العالم بثلاث جرعات من اللقاح المحتوي على الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (الخانق والكلز والشاهوق).

في عام 2014، سُجّلت حوالي 11,400 حالة كلز غير كلز الأطفال و الأمهات في أنحاء العالم. ومن المحتمل أن تكون الحالات الفعلية أكثر من ذلك. ولا يزال كلز المواليد والأمهات يمثل مشكلة في حوالي 20 دولة. وقد قضت حوالي 40 دولة، من بينها الهند، بنجلاديش، مصر والعراق على كلز المواليد والأمهات بين عامي 2000 و2015.

العلاج

يقدم علاج داعم للمرضى الذين يعانون من التشنج، وتُتخذ إجراءات للحفاظ على مجرى مفتوح للهواء. يتضمن علاج فوري باستخدام الغلوبولين المناعي للكلز (TIG) لمعادلة تأثير توكسين الكلز الذي لم يرتبط بعد بالنهايات العصبية. يتم العناية بالجرح، وإعطاء أدوية مكافحة للتشنج، وقد يتم وصف مضادات حيوية. يجب التنويه أن التغلب على عدوى الكلز لا ينتج عنها المناعة ضد المرض في المستقبل، ويوصى بتحصين الناجين من الكلز من المرض بعد شفائهم الكامل من المرض.

الوقاية باللقاح

تقدم الوقاية ضد

الكلز عن طريق توكسيد الكلز "سم الكلز غير الفعال، والمتوفر كتحصين فردي ضد الكلز وحده، أو في عدة توليفات من اللقاح المركب (وأشهر توليفتان هما DTP، والتي تقدم الحماية ضد الدفتيريا والكلز والسعال الديكي للأطفال الأقل من 7 سنوات؛ وتوليفة Td، والتي تقي ضد الكلز والدفتيريا للأشخاص من عمر 7 سنوات أو أكبر). وتبرهن الندرة الشديدة في حالات الكلز بين الأفراد الذين تم تطعيمهم قبل العدوى بمدة تصل إلى 10 سنوات على نسبة فعالية 100% تقريباً لتوكسيد الكلز.

يمكن الوقاية من التيتانوس الوليدي بتمنيع النساء في سن الإنجاب باللقاحات المحتوية على توكسيد الكلز، سواء في الحمل أو في غير الحمل. وفضلاً عن ذلك، فإن الممارسات الطبية الجيدة في إمكانها أيضاً أن تقي من مرض

التيثانوس، وهي تشمل النظافة أثناء الولادة ورعاية السرة، والرعاية الجيدة للجروح في العمليات الجراحية والعمليات الخاصة بعلاج الأسنان

توصيات

تقل مستويات المناعة بمرور الوقت، لذا يوصى بأخذ جرعات تدعيمية ضد الكزاز كل 10 سنوات للمحافظة على الوقاية ضد المرض. يوصى بجرعة تدعيمية للكزاز للأفراد الذين تعرضوا لأي جرح غير نظيف وبسيط، إذا كان قد مر أكثر من خمس سنوات على إعطاء الجرعة الأخيرة من توكسيد الكزاز.

يوصي جدول تحصينات منظمة الصحة العالمية بستة جرعات من لقاحات تحتوي على لقاح الكزاز لتوفير الحماية ضد الكزاز مدى الحياة. تعطى 3 جرعات أولى من اللقاحات التي تحتوي على الكزاز في صورة لقاح الدفتيريا-الكزاز-السعال الديكي (DTwP/DTaP) خلال فترة الطفولة المبكرة بدءاً من عمر شهرين تقريباً. وتتبع السلسلة الأولى جرعة تدعيمية من توكسيد الكزاز في عمر 4-7 أعوام، وللمراهقين في عمر 12-15 سنة وفي فترة البلوغ المبكر. ومن أجل الحفاظ على التخلص من التيثانوس الوليدي وحماية جميع الأشخاص من التيثانوس، توصي المنظمة بإعطاء 6 جرعات من اللقاح المحتوي على التيثانوس لجميع الأشخاص من طفولتهم وحتى بلوغهم مرحلة المراهقة.

لا يُعطى للأشخاص الذين يعانون من حساسية لأحد مكونات اللقاح؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى خلق ردود فعل مثل ضيق حاد في التنفس والانهيار.

• [سلسلة أمراض يمكن منعها باللقاحات](#)

يسعدنا أن تشاركونا آرائكم وتعليقاتكم حول هذه المقالة عبر التعليقات المباشرة بالأسفل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة

[=src](#)

[=src](#)

[=src](#)