

التسمم الميكروبي

دكتور رضا محمد طه

2015-08-25

التسمم الميكروبي

يمثل الطعام وسط جيد ومناسب لانتقال العديد من الأمراض نتيجة لوجود الكائنات الدقيقة به والتي تنتقل إلى الإنسان عند تناوله هذا الطعام وفي بعض الأحيان يقتصر دور الطعم في نقل الميكروب فقط أي أن الميكروب لا ينمو عليه.

ميكروبات الطعام مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تتواجد أو تنمو في الطعام أو تنتقل عن طريق الطعام هي من الأهمية حيث أن دراستها مرتبطة بمجالات واسعة تشمل علوم عديدة منها الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف Sanitation، علم الوبائيات Epidemiology والكيمياء الحيوية وعلوم أخرى.

تقوم الكائنات الدقيقة التي تتواجد بالطعام بالاستفادة من المواد والعناصر الغذائية الموجودة به وذلك لنموها وتكاثرها، وقد يؤدي نمو بعض الكائنات الدقيقة في الطعام إلى تحسين جودته وفي بعض الحالات الأخرى يؤدي إلى تلف الطعام وفساده وكذلك جودته تبعاً لنوع الكائن الدقيق.

استطاع العلماء تصنيف أحد أنواع ميكروبات الطعام وهي البكتيريا إلى خمس مجموعات هي:

1. سالمونيلا وشيجلا Salmonella & Shigella

ويبدأ تلوث الطعام أولاً ببكتيريا سالمونيلا مسببة التهاب الأمعاء Gastroenteritis بأعراض عبارة عن حمى وإسهال وقيء وذلك بعد 12-36 ساعة من تناول الطعام الملوث بالبكتيريا، أما بكتيريا شيجيلا فتسبب نفس الحالة المرضية وعادة ما تنتقل عن طريق الفم نتيجة لتلوث الطعام بفضلات الإنسان أو عن طريق الماء الملوث لكن نسبة الإصابة عن طريق الطعام تكون أكثر من الإطعمة التي تلوث بالشيجيلا السلطة، الخضراوات ومنتجات الألبان إضافة والدواجن.

خلال أغسطس 2014 ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه ظهرت حالات تسمم في أحد البلدان الأوروبية (في بريطانيا)، حيث أخصيت 250 حالة بسبب تناول بيض مصدره واحد وتم الكشف عن سبب هذا التسمم فتبين أنه نتيجة للتلوث ببكتريا "سالمونيلا" وكانت الأعراض عبارة عن قيء، إسهال، تشنجات بالمعدة وحمى وعلي الفور تم نقلهم للمستشفى لعلاجهم.

2. كلوستريديوم بوتولينم *Clostridium botulinum*

هذه البكتريا عندما تلوث الطعام بعد (12- 36 ساعة فترة حضانة) تقوم بإنتاج نوع من السموم له تأثير شديد وقوي على الخلايا العصبية مسببًا ضعف في الرؤية (زغلة) صعوبة في الكلام، شلل *neurotoxins* إسهال وصداع وجفاف بالفم وأخيرًا الوفاة من جراء تناول الإنسان للطعام الملوث بهذه البكتريا.

وهذه *Spores* ومما يزيد من خطورة هذه البكتريا أنها تكون جراثيم الجراثيم عندها القدرة على مقاومة الظروف الصعبة باستثناء الحرارة العالية المستخدمة عند تعليب الطعام (خاصة الطعام الحامضي واللحوم). (والأسماك).

3. كلوستريديوم بريفرينجنز *Clostridium prefringens*

هذه البكتريا لديها القدرة على تكوين جراثيم وأيضا منتج للسموم الذي يسبب المرض خاصة إذا كانت الحرارة المستخدمة في إعداد الطعام الملوث ليست كافية لقتل الجراثيم. اللحوم واللبن والخضروات والسمك والأرز والبطاطس وكذلك الجبن ممكن تلوثها بهذه البكتريا، ترتبط بكتريا كلوستريديوم بريفرينجنز باللحوم وعند تناول اللحوم الملوثة بهذه البكتريا يخرج السم (بعد 8- 22 ساعة فترة حضانة) التي تفرزه هذه البكتريا إلى القناة الهضمية ويسبب إسهال وتشنجات *Cramps* أما بكتريا باسيلس فإنها تفرز في الطعام نوعين مختلفين من السموم أحدهما يسبب إسهال والآخر يسبب قيء.

4. ستافيلوكوكس أوريوس *Staphylococcus aureus*

هذه البكتريا عند وجودها في بعض الأطعمة مثل: الكاستارد، الدواجن، البيض، أي طعام به كريم فإنها تفرز سموم شديدة المقاومة للحرارة

وتنتقل هذه البكتيريا إلى الطعام من خلال طرق ووسائل عديدة في اعداد الطعام لا يراعى فيها شروط السلامة والنظافة، ويسبب السم الذي تفرزه البكتيريا في الطعام قيئ شديد وإسهال بعد نصف-4 ساعات من بعد تناول الطعام الملوث بهذه البكتيريا، هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه البكتيريا تتواجد بشكل طبيعي في أنف وزور الكثير من الأصحاء.

5. ليستيريا Listeria

قد تلوث هذه البكتيريا بعض الأطعمة سواء المعلبة أو غير المعلبة منها الخضروات، اللبن ، الجبن، اللحوم، والأسماك مسببة مرض خطير يسمى ليستيريوسيس Listeriosis أعراضه عبارة عن: حمى، قيئ وإسهال بعد 3 أيام. هذه البكتيريا لاهوائية اختيارية موجبة لصبغة جرام وعضوية. يتراوح معدل الوفيات نتيجة للإصابة بهذه البكتيريا حوالي 20% قد يكون بسبب التهاب المخ meningitis أو تسمم بالدم Sepsis أعراضها حمى، قيئ وإسهال بعد 3 أيام.

خلال أكتوبر وديسمبر 2014 أصابت سلالات من بكتيريا اللستيريا العديد من الامريكان خلال تناولهم لعبوات من التفاح المعلب والمغلف بالسكر مما أدى الي وفاة 7 أشخاص واصابة العشرات.

توجد عوامل بيئية تؤثر في أعداد وكثافة الميكروبات بالطعام وهي:

- درجة الحرارة Temperature حيث تتأثر البكتيريا سلبا بارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة القصوي لها، لذلك يعد تسخين الطعام بشكل كاف أحد وسائل القضاء علي معظم الميكروبات فيه وكذلك الأمان للمستخدم.
- 2-الحموضة PH Acidity: تنمو غالبية أنواع البكتيريا في الوسط المتعادل إلا أن القليل منها ينمو في أوساط حامضية وتسمى بكتيريا حمضية وأنواع أخرى تنمو في أوساط قاعدية وتسمى بكتيريا قاعدية لذلك يمكن التضييق علي الميكروبات عن طريق التحكم في حموضة الطعام.
- 3-الإكسجين Oxygen: تنقسم البكتيريا إلى ثلاثة أنواع حسب احتياجها للأكسجين:

- بكتيريا هوائية : والتي تحتاج إلى وجود الأكسجين كعامل رئيسي في العمليات الحيوية والتحول الغذائي لإنتاج الطاقة.
- بكتيريا لا هوائية: لا تحتاج إلى أكسجين في نموها ويعد الأكسجين ساقا لها حيث تعتمد في إنتاج الطاقة على عمليات تنفس لاهوائية، أما

وجود الأكسجين فإنه ينتج مواد كيميائية مؤكسدة تعمل على تلف أجزاء الخلية وانزيماتها مؤدية إلى موتها.

- بكتريا لا هوائية اختيارية: وهي التي تستطيع العيش في وجود الأكسجين أو عدمه.

بعض أنواع البكتريا تسمى "كامبيلوباكتر" *Campylobacter* وهي حلزونية ذات سوطين في كلا طرفيها وسالبة لجرام ومحببة للأكسجين تم رصدها في أوروبا (في المحلات الشهيرة مثل "سينسيبري") حيث توجد بنسبة 70% في الدواجن المذبوحة الطازجة والموجودة بالماركت. تفرز هذه البكتريا سموما مسببة أعراضا مثل اسهال مدمم، حمى، تشنجات وألم بالقولون. هذه البكتريا يتم القضاء عليها أثناء اعداد أو نضج الدواجن الملوثة بالحرارة كما يمكن أن تصيب هذه البكتريا بعض الحيوانات مسببة لها أجهاض خاصة الماشية والاعنام. يمكن القضاء علي هذه البكتريا باستخدام بعض المضادات الحيوية الخاصة لها

• المواد الحافظة Preservatives: المواد الحافظة التي تضاف للطعام لحفظه لها تأثير ضار على الأحياء الدقيقة (بكتريا فطريات، خمائر) حيث تمنع نشاطها وتكاثرها عن طريق التأثير ووقف نشاط انزيماتها.

والمواد الحافظة نوعين:-

أ- طبيعية : مثل الملح، السكر، أحماض عضوية مثل حمض الخليك وحمض اللاكتيك والتوابل وثنائي أكسيد الكربون CO_2 (يستخدم في حفظ المياه الغازية كعامل مساعد).

ب- صناعية: والتي توجد ضمن متلزماتنا التي نستخدمها في حياتنا اليومية منها:

1. بنزوات الصوديوم وحامض البترويك وأملاحه: ويستخدم في العصائر، المشروبات الغازية، المربى، المانجو.
2. حامض السوربيك وأملاحه: ويستخدم في العصائر، المخللات، منتجات المخاز، الحلوى، اللحوم، الجبن الأبيض.
3. حامض البروبيونيك وأملاحه.
4. ثاني أكسيد الكبريت: ويستخدم في الزبيب، المشمش المجفف، الخضر المجفف، بيض مجفف، جيلاتين بكسويت، حلوى، فاكهة مجففة.

5. أملاح النيتريت والنترات: والتي تضاف إلى ملح الطعام لإنتاج ما يسمى بملح البارود والذي يستخدم في تصنيع منتجات اللحوم (البسطرمة).

وقد توجد المواد الحافظة في المواد الغذائية بكميات قليلة إلا أن استهلاكنا اليومي لها سوف يعمل على تجميع وتراكم كميات كبيرة منها في أجسامنا قد تسبب مشاكل صحية قد تصل إلى الإصابة بالسرطان.

بالإضافة إلى دور المواد الحافظة في وقف نشاط نمو الميكروبات فإنها تعمل على حفظ الأطعمة لاستهلاكها في غير موسمها، كما تعتبر أيضا وسيلة لتقليل الحمل والتلوث الميكروبي.

Food preservatim حفظ الطعام

تهدف طرق حفظ الطعام إلى عدم وصول الميكروبات إلى الطعام وأيضا التخلص وتحطيم الميكروبات الموجودة بالطعام بالإضافة إلى منع الميكروبات الموجودة بالطعام من التكاثر داخل الطعام. ومن طرق الحفظ الحديثة المستخدمة هي التبريد في الثلاثة والتجميد freezing كلاهما يوقف نشاط ونمو البكتريا والتعليب والتجفيف Dehydration هذا بالإضافة إلى مراعاة النظافة والتعقيم أثناء تحضير وتداول الطعام الأمر الذي يمنع تسرب الميكروبات إليه وكذلك تستخدم بعد الفسيل الشديد للخضراوات والحبوب.

أيضا يجب مراعاة النظافة والتعقيم قدر الإمكان عند التعامل مع المواد الغذائية مثل اللحوم واللبن والبيض وذلك لتقليل التلوث بالميكروبات هذا بالإضافة إلى تجنب وإبعاد الذباب والحشرات عن الطعام وذلك بتغطيته أو مقاومة هذه الحشرات وذلك في محيط تداول أو تعليب الطعام.

بعض الفوائد التي تعود علينا من بعض ميكروبات الطعام

عند نمو بعض أنواع من البكتريا في بعض الأطعمة فإنها تكسبه نكهة Flavors وقوام احسن وكذلك طعم مرغوب بالإضافة إلى إنتاج بعض المواد التي تثبط نمو ووجود كائنات أخرى ممرضة ومعظم هذه البكتريا ينتمي إلى أجناس ستربتوكوكس Streptococcus ولاكتوباسيلليسي Lactobacillus وميكروكوكس Micrococcus تستخدم هذه الميكروبات في منتجات الألبان واللحوم والخضروات وتقوم أيضا بدور في حفظ الطعام عن طريق تحويل السكريات التي تحتاجها الميكروبات المتنافسة إلى حمض لاكتيك (تحررها من السكريات) مما يؤدي الي منع نموها والتخلص منها بحمض الوسط الحامضي .PH

نستخدم بكتريا اسيتوباكتر Acetobacter وبكتريا جلوكونو باكتر Gluconobacter في إنتاج الخل Vinegar.

تستخدم بعض الفطريات مثل الخميرة (سكاروميسس Saccharomyces) في صناعة الخبز حيث تستهلك المواد النشوية وتحوله ايثانول وثنائي أكسيد الكربون كما تستخدم أيضا في إنتاج البيرة Brewing.

استخدام البيوتكنولوجيا في الكشف عن ميكروبات الطعام

أدى التقدم في البيولوجيا الجزيئية Molecular biology إلى الأنتظار من قبل العلماء لتطبيقها في عمليات حفظ وتجهيز الطعام من خلال ميكروبيولوجيا الطعام. اهم تطبيق على ذلك هو انتاج مجسات probes (أجزاء من تتابع نيوكليوتيدي معلوم ومعلم بمادة مشعة او صبغة ولها القدرة علي الارتباط بالجزء المكمل لها في حمض النواة الخاص بالميكروب) تستخدم في الكشف عن الميكروبات خاصة الممرضة بالطعام بشكل سريع ساعات وادق واسهل من طرق الكشف التقليدية والتي تتطلب 5 ايام للتعرف على وجود بعض انواع البكتريا مثل سالمونيلا بينما الطرق الحديثة باستخدام المجسمات (تتخصص في تحديد الحمض النووي DNA الخاص بهذه البكتريا) والتي تحتاج يومين.

أيضا من التقنيات السريعة والدقيقة التي تستخدم في الكشف عن ميكروبات الطعام سواء بكتريا مثل لистерيا وسالمونيلا وكامبيلوباكتر أو سموم فطرية مثل أفلاتوكسين هي تقنية "الأليزا ELISA"، وتمتاز أيضا بالكشف عن عينات طعام عديدة في اختبار واحد حيث يحتوي الطبق الخاص بها علي 96 حفرة (مكان لوضع العينة بها).

تلعب بعض الميكروبات المعدلة وراثيا مثل بعض البكتريا والفطريات دورا في النضج السريع لبعض أنواع الجبن مثل "شيدر" بالإضافة الي اكسابها نكهات ورائحة وملمس مرغوب فيها من قبل المستهلك، حيث تزيد تلك العمليات التي تعتمد علي التكنولوجيا الحيوية ملايين الدولارات سنويا في سوق الجبن العالمي.

في دراسة حديثة "2014" تم اكتشاف ان وجود احد مجموعات بكتريا الأمعاء "الشائعة" وهي الكلوستريديا Clostridia ، كما وجد انها تقوم بتقليل حساسية الجسم ضد أنواع الطعام حيث كما إنها تمنع محفزات الحساسية من الدخول لتيار الدم عن طريق التخلص أو اقلال هذه المحفزات للحساسية ويمكن الاستفادة منها في صورة علاج حيوي بدلا من الأدوية الكيميائية التي تضر " Probiotic therapies